

## **AValiação dos Critérios de Near Miss Materno em Mulheres Internadas em UTI de Hospital Terciário: Estudo Descritivo**

**Autores:** Bárbara Freire do Egito Mota<sup>1</sup> (FPS), Gabriela Carneiro Leão de Azevedo<sup>2</sup> (UNICAP), Laura Júlia Siqueira Limongi<sup>3</sup> (UNICAP), Maria Isabel Gomes Campos<sup>4</sup> (UNICAP), Renata Thamires Oliveira de Sá<sup>5</sup> (HAM), Ana Carolina Barbosa Pordeus<sup>6</sup> (HAM).

**Introdução:** O *Near Miss Materno (NMM)* é atualmente definido pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como a mulher que quase morreu, mas sobreviveu a complicações graves na gestação, parto ou até 42 dias pós-parto. O NMM demonstrou ser uma ferramenta para identificar as falhas do sistema de saúde e, em contrapartida, as medidas positivas que foram tomadas, evitando o desfecho de morte. A busca ativa e o estudo desses casos são importantes para avaliar e aperfeiçoar a qualidade do atendimento oferecido, isto é, a identificação precoce de mulheres com condições potencialmente ameaçadoras da vida (CPAV) ou com critérios de NMM permite que elas sejam rapidamente e adequadamente tratadas no serviço.

**Objetivo:** Identificar mulheres que apresentam critérios diagnósticos de *Near Miss Materno (NMM)* em hospital terciário do SUS em Pernambuco.

**Método:** Estudo longitudinal retrospectivo e prospectivo com coleta de dados referentes ao período de janeiro a agosto de 2023 de pacientes internadas na UTI obstétrica que preenchem critérios de *Near Miss Materno*.

**Aspectos éticos:** O estudo foi iniciado após a aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do hospital de referência. Por se tratar de estudo retrospectivo, algumas pacientes não puderam ser contactadas e, portanto, foi solicitada dispensa de TCLE, autorizado pelo CEP.

**Resultados:** Entre o período de janeiro a agosto de 2023, ocorreram 2.846 partos, destes, 29 NMM e 6 mortes maternas (MM). As principais causas subjacentes ao óbito ou near miss, foram os distúrbios hipertensivos (72,4%), patologias concomitantes (20,7%) e hemorragia obstétrica (20,7%). Os maiores índices de mortalidade foram relacionados à hemorragia (25%) e patologias concomitantes (25%).

**Conclusão:** Nossos valores de NMM e MM são altos comparados à literatura nacional e internacional, fazendo-se necessário avaliar a qualidade da assistência médica do serviço. Considerando os resultados do estudo, observa-se que apresentam limitações devido ao tamanho da amostra, sendo fundamental novos estudos para avaliação da assistência do serviço.

---

<sup>1</sup> [barbarafemotaa@gmail.com](mailto:barbarafemotaa@gmail.com)

<sup>2</sup> [gcleaoa@gmail.com](mailto:gcleaoa@gmail.com)

<sup>3</sup> [Laura.siqueira00@gmail.com](mailto:Laura.siqueira00@gmail.com)

<sup>4</sup> [isabelgomes@outlook.com](mailto:isabelgomes@outlook.com)

<sup>5</sup> [Renatathsa@gmail.com](mailto:Renatathsa@gmail.com)

<sup>6</sup> [carolinapordeus@gmail.com](mailto:carolinapordeus@gmail.com)