

Perfil das pacientes submetidas a cerclagem cervical em hospital de referência de Pernambuco

Introdução: A cerclagem é um procedimento de grande valia para a insuficiência istmocervical, uma vez que promove resistência ao colo uterino às pressões exercidas pelo peso fetal, permitindo o prolongamento da gestação e diminuindo as taxas de partos prematuros. **Objetivos:** Descrever o perfil das pacientes submetidas a cerclagem cervical em hospital de referência de Pernambuco. **Método:** Estudo de coorte prospectivo, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob o nº7.048.470. Foram incluídas 53 pacientes que realizaram o procedimento no período de 10 de dezembro de 2024 a 10 de agosto de 2025 e aceitaram participar da pesquisa por meio da assinatura do termo de consentimento. Os valores foram expressos em médias simples e porcentagem. **Resultados:** A média de idade é de 26,8 anos, 60,38% (32 pacientes) se considera parda, 52,83% (28) têm ensino médio completo, 41,50% (22) tem renda familiar de até 1 salário mínimo, 50,94% (27) não são de Recife e Região Metropolitana, 54,72% (29) possuem algum tipo de atividade laboral e 64,15% (34) estão casadas ou em união estável. 90,56% (48) não é tabagista e 60,38% (32) não é etilista. Quanto aos antecedentes patológicos, 9,43% (5) possuíam hipertensão arterial sistêmica crônica, 7,54% (4) desenvolveram hipertensão gestacional e 11,32% (6) desenvolveram diabetes gestacional. Sobre a gestação, 39,62% (21) pacientes eram primigestas e 35,85% (19) têm histórico de aborto. O procedimento foi realizado principalmente em caráter de urgência em 69,81% (37) dos casos, sendo a principal indicação a presença de colo curto confirmado por meio de ultrassonografia (54,71%, 29). Todas foram realizadas sob a técnica de McDonald com fio de polipropileno. **Conclusões:** A partir dos registros obtidos, conclui-se que a cerclagem é realizada em sua maior parte em pacientes jovens, com baixa renda e que já tiveram uma outra gestação anteriormente. Infelizmente, a maioria dos casos foi realizado como um procedimento em caráter de urgência motivados pelas medidas do colo inferiores a 25mm.